

(五)

水浸濕貼之。則不脫落。

一日一貼。

「名稱阿魏清涼膏」

「效能治一切瘡塊」

「藥品用量及切法塊」

阿魏二錢。琥珀一寸。上片白蠟各二分。乳香。沒。硫。雄。各一分。共研末。用蜂蠟一雙。割開去肚裏。乘熱帶血。將藥鋪上。貼於塊上緊壓。

「用法」先以老薑擦塊處。貼後
速出濁氣爲驗。

「名稱」生肌風雞膏

「效能」長肉收口

「藥品用量及製法」

雞蛋（煮熟去白用黃十餘個。
銅杓內熬油傾入盞內）油三錢
。輕粉一錢。醋骨血竭乳香各
五分。共攪勻。

（未完）

四種最普通的通

(一)元明粉(即鹽硫黃)。其作用有
瀉藥。鹽類入腸。其作用有
(二)如能令腸吸收管之吸收
能稱爲堅實。亢進腸動。而諸
瀉下之目的。故人謂「鹽劑對
堅者」蓋以此也。

元明粉係用朴硝(即鍊磺酸同
萊蘇克再用甘草醇。萊蘇克爲
化學。甘草爲緩藥。朴硝無
此製煉。猛烈之化學爲和平。
有通便之效。無傷正之弊。
且朴硝之性。原屬鹹寒清涼攻
下。兼而有之。故件最易於用。
便較般派瀉劑之陽明症。身熱
爲君藥也。每用四錢至八錢。
空服水服之。若日亦停食。
溫病使秘。常習使秘。熱性黃
疸等。

(二)郁李仁。本草經治大腹水
腫。面目四肢浮腫。利小便水
道。和漢方致於利尿尿藥。云
有利水之效。適應於水腫病。
其言蓋與本經同。通使之說。

(尤學周)

【症狀】在妊娠一月至二月後。現惡心。嘔吐。胸膈。等象。劇者不但每食即吐。即在空心飢餓時。胃中絲毫無物。亦嘔吐不休。以此點水不能下咽。因而虛弱。漸至困頓異常。神疲力乏。頭暈目眩。

【療法】輕者不必服藥。耐心靜養。久能自止。因感情之衝動。或受重大刺激。亦能自愈。吐之劇者。須從事調理。半夏二錢。茯苓一二錢。生薑三片。先用伏龍肝五錢。打碎。置器中用水攪之。後靜置。取澄清之水煎藥。服之甚驗。或用半夏。陳皮。茯苓。旋覆花各一錢。甘藷三分。姜皮六分。沖生地汁一杯服。

【方劑】
子劑

【原因】患此症者。多屬血虛之人。所謂血虛則生風也。血不足者。虛陽無依。上逆而沖激腦神經。

【症狀】初起頭痛。暈眩。耳鳴眼花。瞳孔散大。呼吸不舒。心窩痞硬。顏面潮紅。脛即抽搐。咽沫。人事不省。似中風而實非中風。連續發作。以致不救。

(未完)

途健婦指痛疾婦解
徑廣女尋苦病女決

簡明辨症法	心理治療法	實驗療法	根本美容法	肝氣自療法	血崩急救法	久帶靈效法	不藥治病法
-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------

(楊志一)

淡竹葉。色綠而微黃。澆水泡之。狀若薄羅之綠葉。功能驅邪惡。轉經絡。增加運行運動。每用五分。六小時後。即得通暢之軟便。其力蓋較大於大黃也。(大黃少用健胃。多用瀉下。)

(編者按)用元明粉須另沖。或一湯即服。食過則失其功效。郁李仁須去衣。油類最易惹胃。凡瘕瘕難心反胃者。不特葷葷子油不可用。卽麻仁。瓜蒌仁。亦宜審慎。(完)

我船

前章雖有具體的辦法。然製煉之時。固不能囿圖做去。必須有精確之觀察。酌其攸宜。何者宜於膏精。何者宜於末露。細爲分類。庶可流行無弊。莫不敏。敢以鄙見作詳細之考證。察其品性。條分縷析。以商於諸君之前。惟以經驗不多。難免有不適宜之處。尙望閱者加以糾正。使其得爲純粹之改良方法。幸甚。

我國之藥雖多。而常用者。不過二三百味。茲欲每味考察。將依据何種本草而可。以余觀之。本草綱目多。神農本草太少。折衷二者之間。本草備要善矣。爰據其所載藥品爲定規。

我國所有藥物之製造。用歸納法概括之。其法有四。

10

黃芪 味甘厚氣分藥也宜於高○天著
味甘厚氣分藥然後以膏以↓下煎推
甘草 味甘厚製養最宜
人參 甘溫補氣之藥最宜製
膏古人多有行之者矣
高麗參 亦曰東洋參氣味性宜似
人參但力較遜亦宜製膏
太子參 氣味甘質同人參宜製膏
黨參 甘平補養之藥宜製
白朮 甘平而溫氣分補藥古人
多用以熬膏者可知其宜
甘草 溫氣味辛烈其性宜於製膏古人治
濕氣身痛者以煮水煎膏貼服是已開先
例矣
玉竹 甘平補益之藥其性養非多服不
能見功效故本草有熟禁食之說
黃精 甘平補益之品與玉竹功用相
近亦長服之藥也故宜製膏